УДК: 616.831-005.1-036.86-06:616.89-008

Стан після ішемічного інсульту: клінічний випадок

Свиридова Н.К.

д.мед.н., професор, завідувач кафедри неврології і рефлексотерапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Інгула Н.І.

Аспірант кафедри неврології і рефлексотерапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Белякова І.М.

Інтерн кафедри неврології і рефлексотерапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Руда Н.Р.

Інтерн кафедри неврології і рефлексотерапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Підгірна Х.І.

Інтерн кафедри неврології і рефлексотерапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Щербатий А.А.

Лікар-невролог Рівненського обласного центру психічного здоров'я Рівненський державний базовий медичний коледж

Резюме

Цереброваскулярні захворювання (ЦВЗ) – складають від 30 до 50% усіх захворювань серцево-судинної системи, зокрема 110 тис. нових випадків мозкового інсульту (MI) щорічно реєструються в Україні, з яких 30-40% закінчуються летально у перші 30 днів та до 50% упродовж 1 року. Первинна захворюваність на MI у 1,5-2 рази перевищує середньосвітові показники. Серед найбільш значущих факторів ризику виникнення інсультів виділяють артеріальну гіпертензію (АГ), захворювання серця (ішемічна хвороба серця, порушення серцевого ритму), транзиторні ішемічні атаки в анамнезі, цукровий діабет, атеросклероз (дисліпідемія). На основі проведених досліджень доведено, що рівень систолічного артеріального тиску корелює зі зниженням ризику виникнення інсульту у хворих на АГ.

У статті описаний клінічний випадок з практики – ведення пацієнта після перенесеного гострого порушення мозкового кровообігу. Акцентується увага на методах обстеження, основній тактиці лікування та реабілітації хворого з даною патологією.

Ключові слова: клінічний випадок, ішемічний інсульт, артеріальна гіпертензія, методи обстеження, диференційна діагностика, лікування, реабілітація, Армадін.

Пацієнт Н., 51 рік, був госпіталізований до неврологічного відділення з попереднім діагнозом «Артеріальна гіпертензія. Стан після гострого порушення мозкового кровообігу (27.07.15 р.)» з метою обстеження, лікування та проведення реабілітації.

При знаходженні хворий скаржився на слабкість в лівих кінцівках, більше в руці, відчуття оніміння бічної поверхні лівого стегна, кінчиків пальців лівої руки та ноги, перекошена ліва половина обличчя (переважно в нижніх відділах), порушення мови, періодичне поперхування рідиною, посилене слиновиділення, зниження пам'яті на поточні події, труднощі при концентруванні уваги, періодичне підвищення АТ до 170-180/100 мм рт. ст. (1-2 рази на тиждень), що супроводжується шумом у вухах та головним болем в скроневих ділянках.

Анамнез захворювання

Більше 20 років хворіє на артеріальну гіпертензію. Систематично не лікувався. Захворів гостро 27.07.15 р., коли на фоні різкого підвищення АТ до 240/180 мм рт. ст. з'явилися скарги на слабкість лівих кінцівок, перекошене обличчя та порушення координації. Був госпіталізований в неврологічне відділення Бучанської міської лікарні, де встановлено діагноз: «Гостре порушення мозкового кровообігу за ішемічним типом в басейні правої середньої мозкової артерії». За час перебування в лікарні хворий отримав курс медикаментозної терапії і був виписаний з незначним покращенням. Госпіталізований 10.11.15 р. в плановому порядку в II неврологічне відділення КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня» з метою обстеження, лікування та проведення реабілітації.

Анамнез життя

Кір, краснуху, туберкульоз, цукровий діабет, вірусні гепатити, венеричні захворювання заперечує. Оперативні втручання та травми виключає. Алергологічний анамнез зі слів хворого не обтяжений. Шкідливі звички заперечує. Спадковий анамнез обтяжений (батьки хворіють на артеріальну гіпертензію). З дитинства хворіє на сенсоневральну приглухуватість.

Об'єктивний статус

Загальний стан хворого середнього ступеню важкості. Нормостенічної тілобудови. Шкіра тілесного кольору, без висипань. Тургор збережений. Слизові оболонки рожеві, вологі, чисті. Ступінь розвитку підшкірно-жирової клітковини помірний. Лімфатичні вузли при пальпації не збільшені, рухомі, безболісні та неспаяні з навколишніми тканинами. Щитоподібна залоза при пальпації звичайних розмірів та консистенції, безболісна. Артеріальний тиск 130/80 мм рт. ст., частота серцевих скорочень 78 уд./хв., задовільного наповнення, ритмічний, симетричний. В легенях вислуховується везикулярне дихання над всією поверхнею, хрипи відсутні. Живіт м'який, безболісний у всіх відділах. Симптоми подразнення очеревини відсутні. При пальпації печінка по краю реберної дуги, безболісна, не змінена. Селезінка не пальпується. Симптом Пастернацького негативний з обох сторін. Набряки відсутні. Фізіологічні відправлення в межах норми.

Неврологічний статус

Хворий у свідомості, орієнтований у місці, просторі і часі.

Хоботковий рефлекс «+», симптом Марінеску-Радовичі справа «+». Очні щілини D=S, зіниці D=S, фотореакції збережені, живі. Рухи очних яблук в повному обсязі. Ністагм горизонтальний, дрібно розмашистий, при погляді в сторони. Конвергенція не порушена. Обличчя асиметричне, за рахунок згладженої лівої носо-губної складки, опущення кута роту, симптом «паруса» зліва. Глотковий рефлекс дещо знижений з обох сторін. Язик по середній лінії. Ковтання в нормі, фонація не порушена. Наявні елементи дизартрії.

Глибокі рефлекси: з рук і ніг S>D, живі. Патологічні рефлекси: симптом Бабінського, Штрюмпеля та Пусеппа позитивні зліва.

Сила в верхніх кінцівках: ліва рука в дистальних відділах 2,5 бали, в проксимальних відділах 3,5 бали, права рука в дистальних та в проксимальних відділах 5 балів. Сила в нижніх кінцівках: зліва – в проксимальних та дистальних відділах 3,5 бали, справа – в проксимальних та дистальних відділах 5 балів. Тонус у лівих кінцівках підвищений за цен-

тральним типом (тип складного ножа). Проба Барре (верхній Барре та нижній Барре) позитивна зліва, проба Панченка позитивна зліва.

В позі Ромберга хиткість. Пальце-носову пробу виконує з промахуванням з обох сторін. При п'ятково-колінній пробі - інтенція зліва. Хода порушена.

При дослідженні чутливості – показує гіпестезію по мозаїчному типу. Вібраційна чутливість знижена в дистальних відділах лівих кінцівок. Менінгеальні знаки на момент огляду відсутні. Визначається емоційна лабільність.

Для оцінки психоемоційного стану та аналізу когнітивних порушень хворий був протестований по наступних шкалах:

- 1. Шкала інсульту національного інституту здоров'я NIHSS - 6 балів (неврологічні порушення легко-го ступеня)
- 2. Шкала MMSE - 27 балів (легкі когнітивні порушення)
- 3. Монреальська шкала когнітивної оцінки MoCA – 25 балів (легкі когнітивні порушення)
- 4. Тест «Батарей лобної дисфункції» - 17 балів (не змінена)
- 5. Тест малювання годинника - 10 балів (норма)
- 6. Шкала Занга - 58 балів (легкий тривожний розлад)
- 7. Шкала HADS – 20 балів (клінічно виражена тривога/депресія)
- 8. Шкала Спілбергера-Ханіна – 45 балів (середній рівень ситуативної тривоги), 43 бали (середній рівень особистісної тривоги)

Обстеження лабораторні:

- 1. Загальний аналіз крові (29.10.15 р.): гемоглобін – 138 г/л, еритроцити – 4,0 x 10¹²/л, лейкоцити – 9,1 x 10⁹/л, ШОЕ – 6 мм/год, тромбоцити – 280 x 10⁹/л.
- 2. Загальний аналіз сечі (29.10.15 р.): питома вага - 1017, білок «-», глюкоза «-», лейкоцити – 3-6 в полі зору, бактерії «-», солі оксалатів ++.
- 3. RW (18.10.15 р.) – негативна.
- 4. Глюкоза крові (29.10.15 р.): 6,8 ммоль/л.
- 5. Біохімічний аналіз крові (29.10.15 р.): білірубін загальний – 23,6 ммоль/л (прямий – 2,1 ммоль/л, непрямий – 14,11 ммоль/л), тимолова проба – 6,0 од, трансаміназа печінкова – 0,7 ммоль/л, сечовина – 5,0 ммоль/л, креатинін – 0,065 ммоль/л, загальний білок- 80 г/л, амілаза – 17 мг, холестерин – 7,31 ммоль/л, бета-ліпопротеїди – 80 од.
- 6. Коагулограма (29.10.15 р.): протромбіновий час згортання за Лі-Уайтом – 9'23», ПТІ – 88%, фібриноген – 4,75 г/л, тромботест – V ст., фібринолітична активність крові – 15,5%, ретракція згустку – 34,5%, фібриноген В – негативний, гематокрит – 50,0%.
- 7. Ліпидограма (29.10.15 р.): холестерин заг. – 5,4

ммоль/л, тригліцериди -2,4 ммоль/л, ЛПВЩ – 1,0 ммоль/л, ЛПНЩ – 3,8 ммоль/л, ЛПДНЩ – 0,6 ммоль/л, індекс атерогенності – 4,4.

Обстеження інструментальні:

Електрокардіографія (26.10.15 р.): Нормальне положення ЕВС. ЧСС – 72 уд/хв. Часта передсердна екстрасистолія. Виражені метаболічні, склеротичні зміни міокарда.

Рентгенографія органів грудної клітини (26.10.15 р.): Легеневі поля без інфільтративних змін. Корені структурні. Серце в межах норми.

МРТ головного мозку (11.09.15 р.) На серії томограм головного мозку в басейні кровопостачання середньої мозкової артерії в кортико-субкортикальних відділах правої лобно-скронево-тім'яної ділянки визначається неправильної форми з нечіткими нерівними межами неоднорідної структури в режимі f1a1r вогнище кістозно-рубцевої деформації умовними розмірами 7,2х3,95х5,5 см. Паравентрикулярно вогнища лейкоареозу. Заключення: На фоні атрофічного процесу головного мозку, енцефалопатії, описані зміни в правій гемисфері у вигляді вогнища кістозно-рубцевої трансформації вказаної локалізації та змін по периферії характерні для повторного порушення мозкового кровообігу по ішемічному типу в басейні правої середньої мозкової артерії, підгостра стадія (Рис.1).

Рис.1. МРТ головного мозку

Дуплексне сканування судин голови та шиї (26.10.15 р.): стенозуючий атеросклероз внутрішніх сонних артерій (лівої – 40-45%, правої – 30-35%), гіпертонічної ангіопатії з формуванням артеріальних деформацій. Вертеброгенна деформація обох хребтових артерій.

Реоенцефалографія (12.09.15 р.): В басейні внутрішньої сонної артерії. Зліва: кровонаповнення підвищено на 17%; тонус крупних і середніх артерій в нормі; тонус дрібних артерій і артеріол в нормі; то-

нус венул в нормі. Венозний відтік вільний. Справа: кровонаповнення підвищено на 20%; тонус крупних і середніх артерій в нормі; тонус дрібних артерій і артеріол в нормі; тонус венул в нормі. Венозний відтік вільний. В басейні хребтової артерії зліва: кровонаповнення в нормі; тонус крупних і середніх артерій в нормі; тонус дрібних артерій і артеріол в нормі; тонус венул в нормі. Венозний відтік вільний. Справа: тонус крупних і середніх артерій в нормі; тонус дрібних артерій і артеріол в нормі; тонус венул в нормі. Венозний відтік вільний.

Консультації суміжних спеціалістів:

- Кардіолог (10.11.15 р.): Ішемічна хвороба серця: атеросклеротичний кардіосклероз. Гіпертонічна хвороба ІІІ ст., 3 ст. Часта передсердна екстрасистолія. СН І ст.
- Окуліст (29.10.15 р.): Гіпертонічна ангіопатія сітківки обох очей. Вікова пресбіопія.
- Психіатр (02.11.15 р.): Органічне ураження головного мозку змішаного генезу (гіпертонічна хвороба ІІ ст., ГПМК від 27.07.15 р.) з легким інтелектуально-мнестичним зниженням, когнітивними порушеннями, цереб्रो-стенічним синдромом.

Клінічний діагноз

Церебральний атеросклероз. Гіпертонічна хвороба ІІІ ст. Стан після повторного гострого порушення мозкового кровообігу (27.07.15 р.) за ішемічним типом в басейні правої середньої мозкової артерії з лівобічним геміпарезом до глибокого в кисті та помірного в нозі, порушенням функції лицевого нерву за центральним типом зліва, явищами дизартрії, помірно вираженими статико-динамічними порушеннями, вестибуло-координаторними порушеннями, легкими когнітивними розладами, вираженим астено-невротичним синдромом.

- Проведене лікування протягом перебування в стаціонарному відділенні:
1. Антигіпертензивні препарати, для корекції рівня артеріального тиску: бета-блокатор - небілет - 5 мг 1 раз на день, інгібітор АПФ - раміприл -5 мг 1 раз на день
 2. Гіполіпідемічні препарати (статины) для зниження синтезу холестерину і тригліцеридів: аторвастатин - 10 мг 1 раз на день
 3. Міорелаксанти, для корекції підвищеного м'язового тону в кінцівках: мідокалм 1,0 в/м 1 раз на день
 4. Вітаміни групи В для покращення кровообігу і нормалізації роботи нервової системи: вітаксон 2,0 в/м 1 раз на день
 5. Для профілактики виникнення повторного інсульту: препарат з антитромботичною дією – ацетилсаліцилова кислота 100 мг 1 раз ввечері після їжі.

Диференційна діагностика

Нозологія Клінічна картина	ГПМК за ішемічним типом	ГПМК за геморагічним типом	Пухлини ГМ	Енцефаліти	Абсцес ГМ
Початок	Гострий	Гострий	Підгострий або поступовий	Гострий чи підгострий	Підгострий
Анамнез	Атеросклероз, АГ і інші захворювання ССС, цукровий діабет	Артеріальна гіпертензія	Без особливостей	Контакт з хворим вірусною інфекцією чи перенесена вірусна інфекція	Патологія легень, «сині» вади серця, бактеріальний ендокардит, відкрита проникаюча ЧМТ, імунодефіциті стани.
Вогнищева симптоматика	Характерна	Характерна	Характерна	Характерна	Характерна
Загальноомозкова симптоматика	Не виражена	Виражена	Наростає поступово	Виражена	Виражена
Зв'язок з артеріальною гіпертензією	Так	Так	Немає	Немає	Немає
Ліквор	Норма	Кров'янистий, ксантохромний	Клітинно-білко-ва дисоціація, зниження рівня глюкози	Лімфоцитарний або лімфоцитарно-нейтрофільний плеоцитоз, дещо підвищений вміст білка, підвищений тиск.	Норма або плеоцитоз (лімфоцити і полінуклеари), підвищення рівня білка, підвищення тиску
КТ	Гіподенсивне вогнище візуалізується в більшості випадків через 12-24 год	Вогнище підвищеної щільності	Гіперденсивні (підвищеної щільності) утворення, нерідко оточені гіподенсною зоною (набряк мозку).	Ділянки різного зниження щільності набряклої мозкової тканини.	Округлий об'ємний утвір з чіткими, контурами підвищеної щільності з зоною зниженої щільності в центрі. По периферії капсули – зона набряку
МРТ	Т-1: гіпоінтенсивне вогнище, Т-2: гіперінтенсивне.	МРТ-вогнище підвищеної щільності паренхіми мозку	З контрастуванням – накопичення контрасту.	Вогнищеві зміни, накопичення контрасту	Т-1: від центральної і периферичної частини - зниження сигналу, від стінки капсули - гіперінтенсивний. Т-2: центральна частина - гіпоінтенсивний сигнал, а периферична – гіперінтенсивний. Капсула має чіткі межі
ЕЕГ	Дезорганізований α- ритм, велика кількість швидких хвиль, але кількість їх і амплітуда зберігаються в межах варіантів норми.	Зміщення серединних структур мозку. Поява вогнищ біоелектричної активності, іноді – зони епіактивності.	Дифузні неспецифічні зміни, домінує повільна активність	Вогнище патологічної активності в вигляді δ-хвиль і більш повільних коливань в зоні розташування абсцесу.	

6. Для нейропротекторної та антиоксидантної дії, покращення передачі нейромедіаторів по синаптич-ним зв’язкам рекомендовано препарат Армадін за схемою:

Армадін (добова доза)	З 1-ої по 10-у добу		
	Ранок	Обід	Вечір
800 мг	300 мг в/в крапельно 1 раз/добу	-	500 мг Армадін Лонг рег ос (1 таблетка)
З 10-ої по 20- у добу			
700 мг	100 мг в/м 1 раз/добу	100 мг в/м 1 раз/добу	500 мг Армадін Лонг рег ос (1 таблетка)

Комплексна дія Армадіну захищає клітини го-ловного мозку від прогресування пошкодження при ішемії, підсилює компенсаційну активність гліколізу і знижує пригнічення окисних процесів цитратного циклу, відновлюючи енергетичні процеси нейронів. За рахунок мембранопротекторної дії, забезпечує синаптичну та нейрональну передачу, а завдяки нормалізації рівню дофаміну в мозку, виявляє анксіолітичну, ноотропну дію, допомагає пацієнтам підвищити стресостійкість. Лікарський препарат допомагає підвищити концентрацію уваги і працез-датність, знижує ризик втрати і розладів пам’яті, знімає напади судом. Армадін нормалізує процеси метаболізму в клітинах мозку, покращує циркуляцію крові по дрібних судинах і її реологічні властивості, знижуючи агрегацію тромбоцитів. Багатогранна дія медикаменту знижує загальний вміст ЛПНЩ і холестерину в крові.

Показання для призначення Армадіна (згідно інструкції):

- 1) порушення кровообігу мозку
- 2) травми голови і їх наслідки
- 3) нейроциркуляторна дистонія
- 4) дисциркуляторна енцефалопатія
- 5) тривожні і когнітивні розлади (при атеросклерозі)
- 6) стан, схожий з неврозами
- 7) інфаркт серцевого м’яза в гострому періоді
- 8) відкритокутова глаукома
- 9) запальні процеси з гнійними ускладненнями черевної порожнини.

Спосіб застосування (згідно інструкції):

- 1) Лікування Армадіном починають з 250-500 мг (таблетки) і 50-100 мг (ін’єкційного розчину). Добо-ва доза не більше 800 мг 2-3 рази на добу.
- 2) В/в і в/м розчин слід вводити 5-7 хвилин, при краплинному в в введенні швидкість повинна складати 40-60 крап./хв. При краплинному введення Армадін потрібно розводити з 200 мл фізіологічного розчину.

3) Дозування препарату індивідуально варіюється і залежить від перебігу основної хвороби і супутніх захворювань.

4) При порушеннях кровообігу судин мозку Армадін призначають 1 раз/добу 2-4 дня по 200-300 мг крапельно в/в, після - в/м по 100 мг 3 рази/добу протягом 10 – 14 днів. Лікування слід продовжувати таблетованими формами Армадину® Лонг 300 мг та 500 мг, по 1 таблетці 1-2 рази на день протягом 2-3 місяців.

Реабілітація (на тлі адекватної медикаментоз-ної терапії)

1. Заходи спрямовані на зменшення спастичності та попередження контрактур:

- Лікування положенням (укладка кінцівок з використанням спеціальних лонгет на 2 години (1-2 рази на день) таким чином, щоб м’язи, в яких спостерігається підвищений тонус, були розтягнуті)
- Лікувальна фізкультура (спеціальні анти-співдружні пасивні та пасивно-активні рухи, баланс-терапія, кінезітерапія)
- Функціональна електростимуляція (міостиму-ляція в русі моделює фізіологічний патерн нервово-м’язевої активності не тільки на рівні спінальних локомоторних структур, але і на більш високих рівнях ієрархії цен-тральної нервової системи, що і визначає його резистентність)
- Рефлексотерапія
- Магнітотерапія (основні лікувальні ефекти низькочастотного магнітного поля: вазоак-тивний, протинабряковий, гіпотензивний, трофічний, гіпокоагулюючий, нейротроп-ний)
- Вибірковий масаж
- Теплолікування – парафінові або озокеритові аплікації на спастичні м’язи

2. Медикаментозне лікування: основний засіб бо-

- ротьби зі спастичністю – прийом міорелаксантів
- 3. Логопедична терапія (може оптимізувати безпеч-ність ковтання, сприяти відновленню навичок комунікації пацієнта): заняття з логопедом
- 4. Психологічна та соціальна адаптація: консульта-ція та спостереження у психотерапевта, ліка-ря-реабілітолога

Після проведеного лікування хворий відмітив, що слабкість в лівих кінцівках зменшилась, особливо в руці, відчуття оніміння лівого стегна, кінчиків паль-ців лівої руки та ноги поступово стало проходити, зменшилась спастичність уражених кінцівок. Більш виражені зміни хворий відмітив у динаміці когні-тивно-емоційних порушень: мова почала відновлю-ватись, покращилась пам’ять, особливо на поточні події, нормалізувалось концентрування уваги. При проведенні оцінки неврологічного статусу, психое-моційного стану та аналізу когнітивних порушень відмічалась позитивна динаміка за всіма показника-ми шкал та опитувальників, що використовували на початку лікування.

Після проведеного лікування хворий відмітив, що слабкість в лівих кінцівках зменшилась, особливо в руці, відчуття оніміння лівого стегна, кінчиків паль-ців лівої руки та ноги поступово стало проходити, зменшилась спастичність уражених кінцівок. Більш виражені зміни хворий відмітив у динаміці когні-тивно-емоційних порушень: мова почала відновлю-ватись, покращилась пам’ять, особливо на поточні події, нормалізувалось концентрування уваги. При проведенні оцінки неврологічного статусу, психое-моційного стану та аналізу когнітивних порушень відмічалась позитивна динаміка за всіма показника-ми шкал та опитувальників, що використовували на початку лікування.

Враховуючи позитивну динаміку лікування, рекомендації включають профілактику пов-торного інсульту, враховуючи кардіологічну патологію хворого:

- Для профілактики повторного ішемічного інсульту за наявності ішемічної хвороби серця рекомендовано Армадін Лонг рег ос по 500 мг 1 раз/добу протягом 2 місяців
- Контроль та корекція артеріального тиску та тривалий прийом антиагрегантів
- Гіпохолестеринемічна дієта та прийом статинів, регулярне дослідження ліпідів крові (ліпідограма)
- Санаторно-курортне лікування 1-2 рази на рік

Состояние после ишемического инсульта: клинический случай

Свиридова Н.К.

д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии и рефлексотерапии Национальной медицинской академии после-дипломного образования имени П.Л. Шупика

Ингула Н.И.

Аспирант кафедры неврологии и рефлексоте-рапии Национальной медицинской академии после-дипломного образования имени П.Л. Шупика

Белякова И.М.

Интерн кафедры неврологии и рефлексоте-рапии Национальной медицинской академии после-дипломного образования имени П.Л. Шупика

Руда Н.Р.

Интерн кафедры неврологии и рефлексоте-рапии Национальной медицинской академии после-дипломного образования имени П.Л. Шупика

Подгорная К.И.

Интерн кафедры неврологии и рефлексоте-рапии Национальной медицинской академии после-дипломного образования имени П.Л. Шупика

Щербатий А.А.

Врач-невролог Ровенского областного центра психического здоровья Ровенский государственный базовый меди-цинский колледж

Резюме

Цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ) - составляют от 30 до 50% всех заболеваний сердечно-сосудистой системы, в частности 110 тыс. новых случаев мозгово-го инсульта (МИ) ежегодно регистрируются в Украи-не, из которых 30-40% заканчиваются летально в первые 30 дней и до 50% в течение 1 года. Первичная заболеваемость МИ в 1,5-2 раза превышает сред-немировые показатели. Среди наиболее значимых факторов риска возникновения инсультов выделяют артериальную гипертензию (АГ), заболевания сердца (ишемическая болезнь сердца, нарушения сердечного ритма), транзиторные ишемические атаки в анамне-зе, сахарный диабет, атеросклероз (дислипидемия). На основе проведенных исследований доказано, что уровень систолического артериального давления кор-релирует со снижением риска возникновения инсуль-та у больных АГ. В статье описан клинический случай из практики - ведение пациента после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения. Акцентиру-ется внимание на методах обследования, основной тактике лечения и реабилитации больного с данной патологией.

Ключевые слова: клинический случай, ишемический инсульт, артериальная гипертензия, методы обследования, дифференциальная диагностика, лечение, реабилитация, Армадин

The condition of the ischemic stroke: clinical cause

Svyrydova N.

Department of Neurology and Reflexology,
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

Ingula N.

Department of Neurology and Reflexology,
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

Bieliakova I.

Department of Neurology and Reflexology,
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

Ruda N.

Department of Neurology and Reflexology,
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

Pidgirna K.

Department of Neurology and Reflexology,
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

Shcherbaty A.

Doctor neurologist Health center mentally city
Rovno

Summary

Cardiovascular diseases (CVD) – represent between 30 percent to 50 percent of all cardiovascular system's diseases, and account 110 thousands of new stroke cases every year in Ukraine, death rate during first 30 days is 30-40 % and 50 % during 1st year. Primary stroke morbidity is higher in 1.5-2 times than world's average. The most significant risk factors of stroke are hypertension, heart diseases (coronary artery disease, heart rhythm disorders), transient ischemic attack in anamnesis, diabetes, atherosclerosis (dyslipidemia). According conducted researches it is proven, that level of systolic blood pressure correlates with decreased risk of stroke in patients with hypertension. This article describes a case from clinical practice – management of patient with acute ischemic stroke. The attention is focused on the methods of examination, basic treatment strategy and rehabilitation of patient with this pathology.

Keywords: clinical cause, ischemic stroke, hypertension, diagnostics, differential diagnosis, treatment, rehabilitation, Armadin-

Література:

1. Зозуля І.С. Епідеміологія цереброваскулярних захворювань в Україні / Зозуля І.С., Зозуля А.І. // Укр. мед. Часопис. – 2012. – №5(85). – С. 38-41.
2. Кульмацкий А.В. Частота, патогенез, клініка та профілактика повторних порушень мозкового кровообігу: Автореф. Дис. ... канд. Мед. наук. – К., 2012
3. Зенков Л.Р. - Клиническая электроэнцефалография с элементами эпилептологии Руководство для врачей. М.: МЕДпресс-информ. – 2004. - 368 с.
4. Верещагин Н.В., Пирадов М.А., Суслина З.А. Инсульт: принципы диагностики, лечения и профилактики – М.: Медицина. - 2008. – 176 с.
5. Сіренко Ю.М. Профілактика уражень мозку при артеріальній гіпертензії (Методичні рекомендації) / Ю.М. Сіренко, Г.Д. Радченко, В.М. Граніч [та ін.] // Артеріальна гіпертензія. – 2010. - №2. – С.56-72.
6. Koo J. The Latest Information on Intracranial Atherosclerosis: Diagnosis and Treatment // Interv Neurol. – 2015. – Vol. 4(1-2). – P.48-50.
7. Свиридова Н.К. Комплексное лечение острых нарушений мозгового кровообращения / Свиридова Н.К., Лубенец А.С., Попов А.В., Павлюк Н.П., Усович К.М. Свистун В.Ю. // Східно-європейський неврологічний журнал. - 2015. - № 3. - С. 4-27. <https://journal.neurology.world/kompleksnoe-lechenie-ostryh-narushenij-mozgovogo-krovoobraschenija>
8. Мурашко Н.К. Гіпертензивний криз – фактор дестабілізації мозкового кровообігу / Мурашко Н.К., Кусткова Г.С. // Ліки України. - № 4 (140) – 2010. – С. 66-68.
http://www.health-medix.com/articles/liki_ukr/2010-05-15/10NKMDMK.pdf
9. Мурашко Н.К. Тромболитическая терапия в неврологии: личный опыт / Н.К. Мурашко, Ю.И. Марухно, А.И. Галуша // Ліки України. - № 8 (154). – 2011. – С. 100-101.
http://www.health-medix.com/articles/liki_ukr/2011-09-01/11NKMNLO.pdf

АРМАДІН®

потужний нейропротектор з комплексним механізмом дії

ЕНЕРГІЯ ДЛЯ КОЖНОЇ КЛІТИНИ

Етилметилгідроксипіридину сукцинат
ампули по 100 мг (2 мл по 50 мг) № 10

таблетки 125 мг № 30

таблетки пролонгованої дії по 300 мг и 500 мг № 40

- ✱ Відновлює енергетичний обмін клітини
- ✱ Нейтралізує вільні радикали
- ✱ Захищає і стабілізує мембрани нейрона
- ✱ Нормалізує рівень дофаміну в головному мозку

мікрохім

Інформація призначена для професійної діяльності медичних і фармацевтичних працівників.
Реєстраційне посвідчення №UA/9896/01/01 від 01.08.2014, №UA/12306/02/01 від 28.09.2012,
№UA/12306/01/01 від 19.06.2014, №UA/12306/01/02 від 19.06.2014