Atherosclerotic vascular lesions in patients with chronic brain ischemia

■ Svyrydova N.K.

Department of Neurology and reflexology,
Shupyk National Medical Academy of
Postgraduate Education

■ Kravchuk N. O.

Department of Neurology and reflexology,
Shupyk National Medical Academy of
Postgraduate Education

■ Trinus K.F.

State Scientific Institution « Scientific and
Practical Centre of Preventive and Clinical
Medicine» the State Administration

Summary

Atherosclerotic cardiovascular disease is the leading cause of mortality worldwide. Evidence suggests that the risk of atherosclerosis complications associated not only with local changes within atherosclerotic plaque (such as the state necrotic core or fibrous cap), but also with the state of blood or systemic factors. Circulating levels of cytokines, prothrombotic factors or acute phase reactants may play a role in the occurrence of acute stroke in the presence of affected vessels, even in the absence of stenosis. For example, increased serum biomarkers such as C-reactive protein, cytokines - predict the progression of atherosclerosis and risk of stroke. Stroke, may be caused by atherosclerosis of large arteries supplying the brain, or it may affect smaller branches inside the skull

Keywords: stroke, atherosclerosis, hypertension, clinical case cardioprotectors, metabolic drugs scheme of treatment.

УДК 616.8-08:616.847

Головные боли
при патологических
процессах в области шеи

■ Свиридова Н.К.

д.мед.н., профессор, заведующий кафедры
неврологии и рефлексотерапии Националь-
ной медицинской академии последипломного
образования имени П.Л. Шупика

■ Федаш-Кирсанов А.А.

клинический ординатор кафедры неврологии
и рефлексотерапии Национальной медицин-
ской академии последипломного образования
имени П.Л. Шупика

■ Кучеева И.С.

клинический ординатор кафедры неврологии
и рефлексотерапии Национальной медицин-
ской академии последипломного образования
имени П.Л. Шупика

■ Свистун В.Ю.

врач-интерн кафедры неврологии и рефлексотерапии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика

Резюме

Несмотря на то что головная боль является одной из наиболее частых жалоб больных, встречающихся в повседневной медицинской практике, этому симптому не придается должного диагностического значения. Основными трудностями изучения головной боли являются необходимость длительного сбора анамнеза, невозможность подробного расспроса больного, иногда из-за сильной головной боли, ступорозность типичной головной боли при сочетании ее с другими болевыми феноменами, нередко вторичного рефлекторного происхождения (мышечные спазмы, вазомоторные расстройства и др.). Эффективное лечение головной боли возможно только при условии назначения мероприятий, устраняющих причину возникновения головных болей или воздействующих на механизм ее развития.

Ключевые слова: головная боль, диагностика, лечение, дексibuпрофен

Несмотря на то что головная боль является одной из наиболее частых жалоб больных, встречающихся в повседневной медицинской практике, этому симптому не придается должного диагностического значения. Основными трудностями изучения головной боли являются необходимость длительного сбора анамнеза, невозможность подробного расспроса больного, иногда из-за сильной головной боли, ступорозность типичной головной боли при сочетании ее с другими болевыми феноменами, нередко вторичного рефлекторного происхождения (мышечные спазмы, вазомоторные расстройства и др.). Эффективное лечение головной боли возможно только при условии назначения мероприятий, устраняющих причину возникновения головных болей или воздействующих на механизм ее развития [1,2,3,4].

При диагностике различного вида головных болей необходимо учитывать возможность развития их в связи с разнообразными патологическими процессами в области шеи:

- шейным спондилоартритом
- шейным туберкулезным спондилитом
- шейными добавочными ребрами
- шейным миозитом
- заболеваниями верхнего шейного симпатического узла
- заболеваниями позвоночного нерва.

Головные боли при шейном спондилоартрите характеризуются высокой интенсивностью и упорством, которые обостряются при длительном напряжении шейной мускулатуры, после переохлаждения организма, при изменениях давления. Их развитие связано с рефлекторным раздражением некоторых поверхностных нервов головы, исходящих из задних ветвей шейных нервов и из шейного сплетения (нервы снабжают своими волокнами затылочную и теменно-височные области головы - большой и малый затылочный нервы, большой ушной нерв). Боли начинаются с задней поверхности шеи, затем распространяются на затылочную, теменную

и височные области. На высоте развития головных болей у некоторых больных наблюдается усиленная пульсация височных артерий, что приводит иногда к неправильному заключению о сосудистом происхождении таких болей. При пальпации шеи и головы отмечается ригидность шейно-затылочной мускулатуры, болезненность шейных паравертебральных, затылочных и височных точек. На рентгенограмме шейного отдела позвоночника обнаруживаются шиловидные изменения суставных поверхностей позвонков, а у некоторых больных даже образование между позвонками костных мостиков.

Головные боли при шейном туберкулезном спондилите сопровождаются болями преимущественно в затылочной области, которые уменьшаются в горизонтальном положении больного, усиливаются от применения тепловых процедур, сопровождаются субфебрильной температурой, изменениями крови (лимфоцитоз, повышение СОЭ). Окончательный диагноз может быть поставлен на основании рентгенографии шейного отдела позвоночника, где обнаруживается компрессия тела пораженного позвонка и сужение межпозвоночной щели. Причиной упорных головных болей могут быть иногда шейные добавочные ребра. Раздражая близлежащие шейные чувствительные нервные корешки и нервы, такое добавочное ребро может иногда оказаться причиной интенсивных, упорных головных болей, сходных по характеру и локализации с головными болями при шейном спондилоартрите.

Головные боли при шейных миозитах инфекционного или токсического происхождения сопровождаются болями в заушной области, которые усиливаются при поворотах головы и связаны с раздражением чувствительных нервных окончаний и волокон в грудино-ключично-сосцевидной мышце. Боли при шейном миозите интенсивные, постоянные, уменьшающиеся под действием тепла и салицилатов.

Головные боли при поражении области верхнего шейного симпатического узла сопровождаются развитием сильных, каузалгического типа головных болей в области соответствующей половины головы и шеи.

Головные боли, связанные с заболеванием верхнего шейного симпатического узла («передний шейный симпатический синдром») - отмечаются после инфекционных заболеваний, травмы и у некоторых больных с гипертонической болезнью. Боли ощущаются преимущественно в области лица и передних отделов волосистой поверхности головы, сопровождаются вазомоторными и секреторными расстройствами. Кожные покровы лица на стороне пораженного верхнего шейного симпатического узла обычно гиперемированы, покрыты крупными каплями пота; глазная щель и зрачок сужены, отмечается энофтальм (триада Горнера); на половине головы и шеи до верхнего края ключицы отмечается кожная болевая гиперпатия. Отмечается разница пульса и артериального давления на правой и левой половинах тела, усиленная пульсация височной

артерии на стороне пораженного верхнего шейного симпатического узла. Основное значение в этом процессе придается раздражению чувствительных нервных окончаний и волокон в стенках сосудов головы при расстройствах вазомоторного характера, обусловленных поражением верхнего шейного симпатического узла. При посттравматических или постинфекционных раздражающих тканях узла рубцовых процессах, сопровождающихся сильными головными болями, показана рентгенотерапия узла или даже оперативное иссечение рубцовой ткани.

Головные боли, связанные с заболеванием позвоночного нерва («задний шейный симпатический синдром», или синдром шейной мигрени, описанный Барре в 1925г.). Позвоночный нерв берет начало из звездчатого узла и входит в состав сосудистого сплетения позвоночной артерии и ее ветвей. От позвоночного нерва отходят ветви к твердой мозговой оболочке задней черепной ямки и спинного мозга, надкостнице шейных позвонков, межпозвоночным хрящам. Синдром позвоночного нерва заключается в развитии сильных приступообразных болей в затылочной области, болей в глазах, в области лица, сопровождающихся вазомоторными расстройствами, головокружением (без нарушения функции лабиринта), шумом в голове, неприятными ощущениями в области глотки, изменением тембра голоса. Такой синдром иногда развивается внезапно после резких движений головой или поворотов шеи. При рентгенологическом исследовании шейного отдела позвоночника обнаруживаются явления деформирующего спондилеза, развитию которого часто предшествуют инфекционные заболевания или травма.

Дифференциальный диагноз при синдроме позвоночной артерии

Синдром поражения позвоночной артерии	Болезнь Меньера	Мигрень
Интенсивная головная боль преимущественно в затылочной области	Диффузные головные боли	Локализация боли в правой или левой половине головы
Снижение слуха непостоянно	Значительное снижение слуха	Снижение слуха не характерно
Шум локализуется в голове	Шум в ушах	Шум не характерен
Нистагма нет	Наличие нистагма, симптом Ромберга	Наличие нистагма непостоянное
Рвота бывает крайне редко	Рвота характерно	Рвота бывает крайне редко
Наследственная связь не характерна	Частые указания в анамнезе на наличие такого же заболевания у родственников	Частые указания в анамнезе на наличие такого же заболевания у родственников

Лечение головных болей при так называемом синдроме позвоночного нерва связано с воздействием на патологический процесс в области шейного отдела позвоночника.

Головные боли, связанные с невритами и невралгиями

Невриты на начальном этапе своего развития начинаются с невралгии (болевых нарушений), к которым только в дальнейшем присоединяются признаки выпадения, а преобладание болевых нарушений в первом периоде многих органических заболеваний нервной системы представляет закономерное явление (опухоли нервного ствола или спинного мозга, метастазы в тела позвонков, гипертоническая болезнь, базальный или спинальный арахноидит).

Доказано, что нервные стволы, подобно центральным отделам нервной системы, при их поражении первично не всегда проявляют себя признаками «выпадения». Сначала возникают болевые симптомы и только в последующем к этому присоединяются признаки органического поражения. Болевые признаки зависят от структурных нарушений и составляют единое целое в сложной картине комплекса клинических признаков. Боли в нервных стволах могут сохраняться на всем протяжении развития невритов. Отсутствие явных органических или структурных признаков выпадения со стороны нервных стволов в начальной фазе неврита говорит о том, что невралгия является предварительной фазой, сигнализирующей о развитии тяжёлого заболевания.

Первичные невралгии имеют общие основы происхождения и общий генез с первичными невритами, а вторичные (симптоматические) невралгии всегда сигнализируют о приближении фазы выпадения, развития неврита. На протяжении развития невралгии надо учитывать первичную и вторичную природу, а диагноз невралгии требует всегда большой осторожности и неослабного внимания. При невралгии доказаны факты различия реакции нервных стволов на патогенные воздействия при структурной и функциональной индивидуальности нервных стволов. Именно эти данные предопределяют преобладание болевых явлений в клиническом комплексе признаков разнородных заболеваний. Первичные невралгии могут развиваться остро и внезапно и часто резко обрываются. В основе их обычно лежат легкие формы неврита, возникающие чаще всего при воспалительно-инфекционных или интоксикационных заболеваниях.

К числу наиболее часто встречающихся в неврологической практике невралгий относят невралгию тройничного нерва. Среди факторов, которые лежат в основе симптоматических невралгий тройничного нерва, следует назвать и некоторые инфекционные заболевания, интоксикации и т.д. При этих вторичных невралгиях характерны объективные расстройства чувствительности (гиперестезии, парестезии). Невралгия тройничного нерва может проявляться

спустя длительное время после перенесённой малярии, являясь, таким образом, только единственным моносимптомом перенесенного малярийного заболевания. Невралгия тройничного нерва в дальнейшем имеет склонность к рецидивированию, независимо от вызвавшей ее причины. К числу вторичных невралгий тройничного нерва относятся такие опасные процессы, как постепенно развивающиеся злокачественные или доброкачественные опухоли лицевого костного аппарата и особенно придаточных полостей носа. Вторичные невралгии тройничного нерва в отличие от первичных развиваются постепенно. Невралгии тройничного нерва, в основе которых лежит либо склерозирование костных каналов и постепенное вовлечение в процесс тройничного нерва, либо склерозирование сосудов нервного ствола, являются началом общесклеротического процесса, развивающегося в организме. Эффективность лечения зависит только от методов диагностики для выявления факторов риска и причин развития головной боли.

Методы обследования пациентов с головной болью

При расспросе больного, которого беспокоит головная боль, необходимо учесть, с какого возраста он страдает головными болями, при каких условиях возникает и устраняется головная боль, не зависит ли развитие последней от времени дня, года, изменений давления, гормональными нарушениями и т. д. Важно выяснить характер, интенсивность, продолжительность, частоту, локализацию головной боли, наличие или отсутствие симптомов, сопровождающих головные боли (головокружение, шум в ушах, тошнота и рвота, слезотечение, светобоязнь, выделения из носа или из уха). Например, общим для головных болей, вызванных гистамином, и мигренозных болей, является их периодичность. Однако приступ острой головной боли, вызванной гистамином, продолжается несколько минут; больной при этом отмечает ощущение жара в голове. Приступ сильной мигренозной головной боли продолжается от нескольких часов до 2 - 3 дней. Иногда появлению головной боли при мигрени предшествует мерцательная скотома. Общим для головных болей, вызванных гистамином, и головных болей, сопровождающих воспалительные заболевания придаточных полостей носа, является сочетание болевого синдрома с затруднением носового дыхания из-за отечности и гиперемии слизистой оболочки носовых раковин. Однако необходимо помнить, что при головной боли, вызванной гистамином, вазомоторные расстройства в области носа и глаза возникают остро и обнаруживаются обычно на стороне головной боли. При воспалительных заболеваниях придаточных полостей носа отечность и гиперемия слизистой оболочки носовых раковин часто оказывается двусторонней. Затруднение носового дыхания нередко сочетается с повышением температуры и появлением гнойных выделений из носа [5, 6].

Объективные методы исследования:

- обращает на себя внимание на положение головы, подвижность мимической мускулатуры, ширину зрачков, окраску кожи на лице
 - определяется конфигурация черепа и выясняется, нет ли на голове рубцов, вдавлений, вздутий, трофических и пигментных кожных изменений
 - перкуторное и пальпаторное исследование
 - наличие или отсутствие общей или местной болезненности при перкуссии головы отмечается (многократное появление болезненности в определенной области может быть использовано для целей топической диагностики процесса, например, появление болезненности над местом расположения опухоли при перкуссии противоположного участка головы). У больных с жалобами на головные боли нередко отмечается болезненность в точках кожи на голове, прижимаемых к кости. Эти точки соответствуют проходящим через костные отверстия нервам или лежащим под кожей крупным сосудам. К невралгическим болевым точкам в области головы относят, как известно, тригеминальные точки - надглазничную, подглазничную и подбородочную, а также точки, соответствующие крупным нервным стволам из верхних шейных сегментов спинного мозга - шейные, затылочные, позади ушные точки.
 - наличие или отсутствие болевых феноменов, провоцируемых различными воздействиями на чувствительный нервный аппарат (определения ригидности затылка, симптомов Кернига, Брудзинского).
 - рефлекторно возникающие сокращения черепной и шейной мускулатуры (во время приступа мигрени на стороне головной боли сжатие век, расширение ноздри, поднятие носогубной складки, сокращение грудино-ключично-сосцевидной мышцы с поворачиванием лица вверх и в сторону, противоположную боли, иногда поднятие плеча на стороне боли)
 - при исследовании кожной болевой чувствительности у некоторых больных с жалобами на головные боли удается обнаружить на голове зону болевой гиперестезии или гипестезии, реже анестезии. Такие зоны отличаются четкими границами, имеют форму круглых или овальных пятен, не соответствующих по топоике зонам какой-либо периферической или корешковой иннервации. Эти зоны Захарьина-Геда могут быть использованы вместе с головными болями в качестве дополнительных топоико-диагностических признаков, особенно при внутричерепных заболеваниях.
- Ряд исследователей, изучавших зоны кожной болевой гиперальгезии при головных болях, подчер-

кивается возможность использования зоны Захарьина-Геда не только в целях топической диагностики, но и для терапии головных болей.

Нередкое совпадение локализации патологического очага с топикой зоны Захарьина-Геда, а также стойкость такой зоны позволяют использовать этот болевой феномен в качестве дополнительного топоико-диагностического признака.

Для объективизирования головных болей могут быть применены методы электроэнцефалографии, доплерографии, рентгенографии, магнитно-резонансной томографии.

На *глазном дне* у больных, страдающих головными болями при артериальной гипертензии, обнаруживается сужение артерий и расширение вен. У больных с повышенным внутричерепным давлением на *глазном дне* глаз отмечаются застойные явления.

На *рентгенограммах* черепа у больных с упорными головными болями сосудистого происхождения можно наблюдать чрезмерную выраженность артериальных борозд твердой мозговой оболочки. При повышении внутричерепного давления отмечаются изменения структуры черепных костей; они становятся порозными, наблюдается вторичное, гипертензионно-гидроцефальное расширение турецкого седла. У больных с хроническими воспалительными внутричерепными процессами, сопровождающимися головными болями, на снимках черепа иногда обнаруживается массивное расширение диплоэтических сосудов и обызвествления в арахноидальной оболочке.

При исследовании *спинномозговой жидкости* надо обращать внимание не только на ее состав, но и на давление, хотя повышение внутричерепного давления и не является основным причинным фактором развития головной боли.

Головные боли могут быть при повышенном, пониженном и нормальном артериальном давлении. Повышение артериального давления не является причинным фактором головных болей, но повышение или понижение артериального давления при определенных условиях (влияние на организм различных неблагоприятных факторов внешнего или внутреннего порядка) может способствовать развитию головной боли.

Принципы лечения головной боли

Основным направлением лечения любого заболевания является целенаправленный патогенетический подход, который подразумевает четкое представление о механизме развития заболевания и точное фармакологическое воздействие на его основные звенья, позволяющее остановить прогрессирование патологического процесса. К сожалению, патогенетическое лечение не всегда приводит к быстрому терапевтическому успеху, поэтому не меньшее значение следует уделять симптоматической терапии, направленной на устранение наиболее неприятных проявлений заболевания, прежде всего,

боли. Одним из направлений комплексного лечения головных болей при патологических процессах в области шеи направлено на длительное и качественное устранение болевого синдрома. Принимая во внимание общность патогенетических механизмов развития боли и воспаления в лечении болевого синдрома при хронических заболеваниях позвоночника используются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС). Они сочетают в себе анальгетическое, противовоспалительное и жаропонижающее действие, что обеспечивают эффективное воздействие на основные симптомы при данной патологии [1, 2]. Среди НПВС, по данным работы Bonabello A. [57], дексibuпрофен является фармакологически активной формой и является более мощным, чем ибупрофен. Учитывая, что дексibuпрофен широко используется, чтобы уменьшить боль, лихорадку и воспаление, то в опубликованном обзоре в Cochrane Database (2013г.) оценивали эффективность и безопасность перорального дексibuпрофена при острой боли (MEDLINE, EMBASE и Cochrane Library), используя клинические исследования, чтобы установить обезболивающие свойства, используя методы, которые позволяют сравнить его с другими анальгетиками. Оценивали рандомизированные, двойные слепые, плацебо-контролируемые исследования использования дексibuпрофена для снижения острой боли. Доказано, что эффективную фармакологическую эффективность могут оказывать низкие дозы дексibuпрофена, что может рассматриваться как способ определенного нивелирования развития побочных реакций. В рандомизированных неконтролируемых исследованиях при сравнении с ибупрофеном или диклофенаком рекомендуемая доза дексibuпрофену - 900-1200 мг - была эффективной для лечения острой и хронической боли. Эффективность дексibuпрофену и ибупрофена была на одном уровне, когда дексibuпрофен вводили в половинной дозе [10, 11].

В ходе клинических исследований, проведенных в Украине, продемонстрирована высокая эффективность препарата Зотек (дексibuпрофен) в дозе 400 мг при купировании головной боли у пациентов с мигренью, головной болью напряжения, головной болью, связанной с травмами, цервикогенной головной болью. Таким образом, препарат оказался эффективным для лечения основных видов первичной и вторичной головной боли [9]. В исследовании I.A. Зупанець (2013), с участием 30 пациентов с первичными (мигрень, головная боль физического напряжения) и вторичными (посттравматическая, обусловленная поражением шейного отдела позвоночника) формами головной боли после 3 дней применения препарата Зотек в дозе 400 мг уровень субъективного восприятия боли по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) снизилась с 5,9 до 2,6, а на 6-й день - до 1,0. За период проведения исследования у пациентов с головной болью не обнаружено побочных реакций, соответственно уровень переносимости препарата был признан хорошим.

Исследования по изучению безопасности декси-

бупрофена продолжались в течение 5 лет с участием 4836 пациентов [11], где дексibuпрофен показал сравнимую с диклофенаком, напроксеном и цеlexкоксибом анальгетическую активность, хорошую переносимость и рекомендован как безопасный и эффективный препарат для лечения болевого синдрома в соотношении рацемического ибупрофен/дексibuпрофен - 1:0,5. [5].

В 2012 году было проведено исследование (Pharmacokinetic-Pharmacodynamic Model of Newly Developed Dexibuprofen Sustained Release Formulations), в котором показано, что дексibuпрофен эффективнее влияет на боль в более низкой дозе, чем ибупрофен. Это может свести к минимуму уровень побочных эффектов и, в конечном итоге, улучшить соблюдение больных режима и терапевтического лечения боли [7]. На основании данных пилотного исследования, проведенного в Украине, опыт применения дексibuпрофена (Зотек) для купирования головной боли напряжения и мигрени (Школьник В.М. и др., 2012), был сделан вывод, что препарат Зотек в дозе 400 мг имеет высокую эффективность и хорошую переносимость у пациентов, страдающих ГБН, а быстрота наступления эффекта и низкий спектр побочных явлений особо выделяет указанный препарат среди других НПВС.

Література

1. Jes Olesen. The international classification of headache disorders, 2-nd edition / Headache Classification Committee of the International Headache Society // Cephalalgia. – 2004. – № 24 (Suppl 1). – P.1-160.
2. Bahra A. Cluster headache: a prospective clinical study with diagnostic implications / Bahra A., May A., Goadsby PJ. // Neurology. – 2002. № 58. – С. 354-361.
3. Ekbom K. Age at onset and sex ratio in cluster headache: observations over three decades / Ekbom K, Svensson DA, Traff H, Waldenlind E. // Cephalalgia. – 2002. – № 22. – С.94-100.
4. Russell MB. Epidemiology and genetics of cluster headache / Russell MB. // Lancet Neurol. – 2004. – № 3. – С.279-283.
5. Dodick DW. Indomethacin-responsive headache syndromes / Dodick DW // Curr Pain Headache Rep. – 2004. – № 8. – С.19-26.
6. Blankenburg M. Paroxysmal hemicrania in children-symptoms, diagnostic criteria, therapy and outcome / Blankenburg M, Hechler T, Dubbel G, Wamsler C, Zernikow B. // Cephalalgia. – 2009. – № 29. – P.873-882.
7. Sand T. EEG in migraine: a review of the literature / Sand T. // Funct Neurol. – 1991. – № 6. – С. 722.
8. Rosenberg J. Practice parameter: the electroencephalogram in the evaluation of headache. Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology / Rosenberg J, Alter M, Byrne I'D, et al. // Neurology. – 1995. – № 45. – С.1411-1413.

9. І.А. Зупанець, С.К. Шебеко, І.А. Отрішко Експериментальна оцінка параметрів ефективності препарату „Зотек”: анальгетична та протизапальна дія
10. Rehnasalim. Biowaiver monographs of dexibuprofen / Rehnasalim, R. Sivakumar, Krishnapillai, C. Sajeeth, Haribabu // International journal of pharmaceutical, chemical and biological sciences. – 2013. – № 3 (2). – P.424-435.
11. Derry S1. Single dose oral dexibuprofen [S (+)-ibuprofen] for acute postoperative pain in adults / Derry S1, Best J, Moore RA. // Cochrane Database Syst Rev. – 2013. – Oct 23. – P. 10.

Головні болі при патологічних процесах в області шиї

- **Свиридова Н.К.**
д.мед.н., професор, завідувач кафедри неврології та рефлексотерапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика
- **Федаш-Кірсанов О.О.**
клінічний ординатор кафедри неврології та рефлексотерапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
- **Кучесва І.С.**
клінічний ординатор кафедри неврології та рефлексотерапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
- **Свистун В.Ю.**
лікар-інтерн кафедри неврології та рефлексотерапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Резюме

Незважаючи на те, що головний біль є однією з найбільш частих скарг хворих, що зустрічаються в повсякденній медичній практиці, цьому симптому не надають належного діагностичного значення. Основними труднощами вивчення головного болю є необхідність тривалого збирання анамнезу, неможливість докладного розпитування хворого, іноді через сильний головний біль, стушованість типового головного болю при поєднанні її з іншими больовими феноменами, нерідко вторинного рефлекторного походження (м'язові спазми, вазомоторні розлади та ін.). Ефективне лікування головного болю можливо тільки за умови призначення заходів, що усувають причину виникнення головних болей або впливають на механізм їх розвитку.

Ключові слова: головний біль, діагностика, лікування, дексібупрофен

Headache in the pathological process in the neck

- **Svyrydova N.K.**
- **Fiedash-Kirsanov A.A.**
- **Kucheyeva I.S.**
- **Svystun V.Y.**
Department of Neurology and reflexology,
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

Resume

Despite the fact that headache is one of the most common complaints of patients encountered in everyday clinical practice, this symptom does not provide adequate diagnostic value. The main difficulty is the study of headache need long history collection, inability to detailed questioning of the patient, sometimes because of a severe headache, typical headache when combined it with other painful phenomena, often secondary reflex origin (muscle spasms, vasomotor disorders, etc.). Effective headache treatment is possible only on condition designation measures to eliminate the cause of headaches or influence the mechanism of their development.

Keywords: headache, diagnosis, treatment, deksibuprofen

ДОСЯГНЕННЯ В ЕВОЛЮЦІЇ ЗНЕБОЛЕННЯ!

ЗОТЕК®

НА ЗМІНУ ІБУПРОФЕНУ ПРИЙШОВ ДЕКСІБУПРОФЕН

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЇ

ШВИДКІСТЬ ДІЇ

БЕЗПЕКА ДІЇ

Organosyn

Склад лікарського засобу: 1 таблетка містить дексібупрофену 200 мг або 300 мг або 400 мг. Показання для застосування. Симптоматична терапія болю слабкої та помірної інтенсивності різного походження: зубного болю, болю у спині, суглобах, м'язах, ревматичних болях, дисменореї. Дорослим зазвичай призначають по 1-2 таблетки (200-400 мг дексібупрофену) 3 рази на добу після їди. Побічні ефекти: диспепсія, діарея, нудота, блювання, біль у черевній порожнині, при тривалому прийомі - виразки шлунка та дванадцятипалої кишки, кровотеча в ШКТ, виразковий стоматит, висипання, кропив'янка, свербіж. Умови відпуску. Без рецепта. Зотек®-200 Р.П. № UA/11501/01/01 від 05.05.11 № 261; Зотек®-300 Р.П. № UA/11501/01/02 від 05.05.11 № 261; Зотек®-400 - Р.П. № UA/11501/01/03 від 05.05.11 № 261. Виробник: Сінмедик Лабораторізі, Фарідабад, Індія. Заявник: ТОВ «Сінмедик», м. Київ, вул. Сікорського 8, тел./ факс +38 (044) 456 99 33